



Merkblatt zur Stressechokardiographie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Was ist Stressechokardiographie?

Sie erhalten während der Untersuchung Dobutrex langsam in den Arm gespritzt. Währenddessen wird eine Ultraschalluntersuchung des Herzens unter EKG-Beobachtung durchgeführt. Liegt eine Verengung eines Herzkranzgefäßes vor, so treten Veränderungen der Herzfunktion auf, die mit Hilfe des Ultraschalls beobachtet werden können. Die Dauer der Untersuchung beträgt etwa 15 Minuten. Nach Beendigung der Untersuchung sollten Sie noch ½ Stunde in der Praxis bleiben.

Medikamentennebenwirkungen

Wie bei jedem Medikament können auch durch Dobutrex, das Ihnen während der Untersuchung gespritzt wird, Nebenwirkungen auftreten. Manchmal treten Kopfschmerzen oder ein Druckgefühl im Herzen auf, auch wird häufig Unruhe angegeben, ebenso ein verstärkter Herzschlag. Diese Erscheinungen sind harmlos und halten nur wenige Minuten an.

Wichtig!

Eine Schwangerschaft muss vor der Untersuchung ausgeschlossen sein. Sie sollten etwa 4

Stunden vor der Untersuchung nicht mehr essen. Bitte nehmen Sie am Abend vor der Untersuchung keine Herzmedikamente ein.

Sollten während der Untersuchung behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörungen auftreten, besteht die Möglichkeit zur sofortigen medikamentösen Behandlung bzw. Defibrillation.

Nach Beendigung der Untersuchung dürfen Sie wieder essen und auch Ihre Medikamente einnehmen
Sie können mit dem eigenen PKW nach Hause fahren.

Dr. A. Wilke

Dr. A. Malazhavy

Dr. C. Lüers